nano ELEMENT

Mg, Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Mo, Se, Nd

LENGVAI ĮSISAVINAMI GREITO VEIKIMO MIKROELEMENTAI VISOMS AUGALŲ KULTŪROMS

NANO KARBOKSILATŲ FORMA

SĖKLOMS, SVOGŪNĖLIAMS APDOROTI IR TRĘŠTI PER LAPUS

SKYSTIS, 1 l TALPA

SAVYBĖS

- augalų lengvai atpažįstamas ir įsisavinamas skystis natūralios citrinų rūgšties pagrindu
- visi mikroelementai – nano dalelių dydžio (< 100 nm), todėl lengvai susiriša su nukleorūgštimis ir baltymais, patenka į augalų membranas ir prasiskverbia per ląstelių apvalkalą
- nėra pašalinių priemaišų, kurios įprastai pasižymi toksiniu poveikiu augalams
- įsisavinamas visas, nepalieka pėdsakų dirvoje
- chemiškai suderinamas su kitomis trąšomis ir augalų apsaugos priemonėmis

POVEIKIS

Manganas (Mn) – 800 mg/l
Magnis (Mg) – 1300 mg/l
Molibdenas (Mo) – 160 mg/l
Kobaltas (Co) – 140 mg/l
Neodimis (Nd) – 50 mg/l
Geležis (Fe) – 500 mg/l
Cinkas (Zn) – 400 mg/l
Varis (Cu) – 200 mg/l
Selenas (Se) – 40 mg/l

- varis ir manganas suteikia energijos augalams sėkmingai išdygti ir vystytis
- cinkas, varis, selenas ir neodimis didina augalų imunitetą ir atsparumą chemijos ir klimato sukeltam stresui, padeda augalams atsigauti
- cinkas būtinas sėkmingam kukurūzų apdulkinimui
- magnis, varis, geležis, molibdenas ir kobaltas gerina augalų medžiagų apykaitą, užtikrina subalansuotą mitybą ir azoto pasisavinimą
- varis pasižymi fungicidinėmis savybėmis
- manganas, geležis ir magnis didina fotosintezės intensyvumą

NAUDA

- intensyvesnis fotosintezės procesas
- sveiki augalai su didesniu atsparumu grybelių sukeltoms ligoms
- augalai geriau įveikia klimato ir pesticidų sukelto streso pasekmes
- augalai atsparesni šalčiui
- iki 30 % didesnis derlius ir puikūs kokybės rodikliai

PRIVALUMAI

- produktą patogu naudoti – jis gali būti įtrauktas į bet kokią augalų apdorojimo schemą, nekeičiant įprastos tręšimo tvarkos
- produktą galima naudoti esant bet kokiam pH lygiui ir vandens kietumui
- netoksiškas žmogui ir nedaro žalos aplinkai

NAUDOJIMAS

SĖKLŲ, ŠAKNIAGUMBIŲ APDOROJIMAS

Bulvės	0,1 l/t	Pomidorai, paprikos, agurkai	0,3 l/t	Svogūniniai	0,3 l/t
Burokai	0,3 l/t	Morkos	0,1 l/t		

LAPŲ APDOROJIMAS

Bulvės	0,05 l/ha x 2	(kai stiebo aukštis apie 10cm ir žiedpumpurių susidarymo stadijoje)
Burokai	0,1 l/ha x 2	(liečiant greta eilėje augančių augalų lapus ir liečiant greta vagoje augalų lapus)
Svogūniniai	0,1 l/ha x 2	(pirmą kartą 3–4 lapų stadijoje ir po 2 savaičių)
Pomidorai, paprikos, agurkai	0,1 l/ha x 3	(pasodinus sodinukus, žiedpumpurių susidarymo stadijoje ir intensyvaus derėjimo pradžioje)
Morkos	0,05 l/ha x 2	(pirmą kartą 3–5 lapų stadijoje ir po 2 savaičių)

MB „Aminagra"
Medaus g. 12, Jonučiai, 53246 Kauno r.
Tel.: +370 618 40886
www.aminagra.lt, info@aminagra.lt

aminagra

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS POMIDORAMS

	nano ELEMENT	bio ELEMENT	CITRA PK	CITRA Mag	CITRA Zn
Maitinimas per šaknis	0,1 l	2-3 l			
	darbinis tirpalas maitinimui per šaknis 100 l				
3-4 tikrieji lapai			1,5 l/ha		
8-9 tikrieji lapai			1,5 l/ha	1,5 l/ha	
Žiedpumpurių stadija		1,0 l/ha			1,0 l/ha
Vaisių formavimosi pradinis etapas	0,1 l/ha	1,0 l/ha			

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS AGURKAMS

	nano ELEMENT	bio ELEMENT	CITRA PK	CITRA Mag	CITRA Zn	CITRA Si + K
Sėklų apdorojimas	0,1 l/t	2,0 l/t				
3-5 tikrieji lapai			1,0 l/ha	1,0 l/ha		
Žiedpumpurių stadija		1,0 l/ha			1,0 l/ha	
Vaisių formavimosi pradinis etapas		1,0 l/ha				1,0 l/ha

MB „Aminagra"
Medaus g. 12, Jonučiai, 53246 Kauno r.
Tel.: +370 618 40886
www.aminagra.lt, info@aminagra.lt

aminagra